

## Tipos de pruebas


- Una prueba viral indica si actualmente tiene una infección. Se pueden usar dos tipos de pruebas virales: las pruebas de PCR o las pruebas de antígenos.
- Una prueba de anticuerpos (también conocida como serología) puede indicar si tuvo la infección en el pasado. No diagnostica una infección en curso.

## Quiénes deben hacerse una prueba de detección de infección en curso

- Las personas que tienen criterio de caso sospechoso.
- Las personas que tuvieron contacto estrecho (menos de 2 metros por un total de 15 minutos sin el uso de barbijo o tapabocas con una persona con COVID-19 confirmado)
- Las personas con la vacuna completa no necesitan hacerse la prueba de detección salvo que presente síntomas.
- Las personas con infección por COVID-19 dentro de los últimos 3 meses no necesitan hacerse una prueba de detección después de haber estado expuestas, siempre y cuando no manifiesten síntomas.

## Cuándo usar los tests?

Los profesionales de la salud determinamos la oportunidad para recolectar la muestra según diversas variables de acuerdo a la particularidad de cada caso.



Flujograma de detección y diagnóstico de caso sospechoso (MSAL GBA)



Material de difusión validado por el Dr. Mauro Gómez, la información descripta puede variar en función de la situación epidemiológica actual.

<https://www.linkedin.com/in/mauro-gomez-739a67117>